

Forbel® 750

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd från begynnande stråskjutning (BBCH 31) till och med avslutad blomning (BBCH 69).

Läs medföljande anvisningar före användning.

5 L

 **BASF**
We create chemistry



Preparatbeskrivning

Forbel 750 är ett flytande, organiskt svampmedel med systemisk verkan avsett för användning mot svampsjukdomar i stråsäd. Forbel 750 har mycket god effekt mot mjöldagg, gulrost, brunrost och kronrost samt god effekt mot sköldfläcksjuka. Forbel 750 har mycket god kurativ verkan (stoppeffekt) mot mjöldagg och rost. Redan utbrutna angrepp kan därför kontrolleras effektivt.

Utmärkande egenskaper är god regnbeständighet och god effekt vid kyligt väder. Verknings tiden är 3 – 4 veckor beroende på fuktighet, temperatur och tillväxt.

Forbel 750 får användas från begynnade stråskjutning (stadium 31, BBCH) till och med avslutad blomning (stadium 69 BBCH).

Bruksanvisning

Mjöldagg: 0,25 – 0,5 l/ha Forbel 750 vid begynnande angrepp. Vid upprepad behandling blanda med 0,25 – 0,5 l/ha Flexity.

Gulrost: 0,5 l/ha Forbel 750. Behandling tidigt så snart de första gulrostpustlarna upptäcks. Upprepa behandling vid stark infektion och rostkänsliga sorter. Mottagliga sorter behandlas förebyggande och med upprepad behandling.

Brunrost: 0,5 l/ha Forbel 750 vid begynnande angrepp. Upprepa behandlingen vid kraftiga angrepp och i mottagliga sorter.

Kornrost: 0,5 l/ha Forbel 750 vid begynnande angrepp. Upprepa behandlingen vid kraftiga angrepp och i mottagliga sorter.

Sköldfläcksjuka: 0,5 l/ha Forbel 750 vid förebyggande behandling. Upprepa behandlingen vid kraftiga angrepp och i mottagliga sorter.

Kronrost: 0,5 l/ha Forbel 750 vid begynnande angrepp.

Gröda	Svamp-sjukdom	Dos /ha	Behandlings-tidpunkt	Max antal behandlingar /år	Vatten mängd	Karens
Höstvete Vårvete	Mjöldagg Brun rost Gulrost	0,25 – 0,5 l (+Flexity) 0,5 l 0,5 l	Stadium 31-69 (BBCH)	2 (minsta behandlings- intervall 21 dygn)	100 – 400 l/ha	35 dagar
Höstkorn Vårkorn	Mjöldagg Kornrost Sköldfläck- sjuka	0,25 – 0,5 l (+Flexity) 0,5 l 0,5 l	Stadium 31-69 (BBCH)	2 (minsta behandlings- intervall 21 dygn)	100 – 400 l/ha	35 dagar
Råg Rågvete	Mjöldagg Brunrost Gulrost Sköldfläck- sjuka	0,25 – 0,5 l (+Flexity) 0,5 l 0,5 l 0,5 l	Stadium 31-69 (BBCH)	2 (minsta behandlings- intervall 21 dygn)	100 – 400 l/ha	35 dagar
Havre	Mjöldagg Kronrost	0,25 – 0,5 l (+Flexity) 0,5 l	Stadium 31-69 (BBCH)	2 (minsta behandlings- intervall 21 dygn)	100 – 400 l/ha	35 dagar

Ytterligare villkor

Vindanpassat skyddsavstånd

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av „Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom“.

Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.

Utformning av spridningsutrustning

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Filtren ska bytas och underhållas enligt tillverkarens rekommendation. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Villkoret är till för att skydda ögonen.

Vattenmängd

Vattenmängden anpassas till sprututrustning och sprutbetingelser. Riktvärde 100 – 400 l/ha.

Blandbarhet

Forbel EC är blandbar med; Comet EC, Flexity SC och Sportak EW.

Forbel EC är även enligt labb-tester kemiskt och fysiskt blandbar i tre-komponent blandningar med; Flexity SC + Primus SC,

Flexity SC + Starane XL SE

Flexity SC + Terpal SL (använd skumdämpare, Vid blandning med Terpal: sänkt Terpaldos – se Terpaetikett.)

Flexity SC + Moddus M EC

Flexity SC + Cerone SL (använd skumdämpare)

Cycocel Plus SL + Flexity SC

Vid blandning av två eller fler komponenter starta alltid med de fasta formuleringarna, i följande ordning, WG, WP, SG, SP. Tillsätt därefter eventuella flytande formuleringar, först vattenbaserade, i ordningen, SC, CS, SL. Därefter formuleringar baserade på lösningsmedel, i ordningen, SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst innan nästa produkt tillsätts.

Forbel 750 är ej blandbart med Mn-sulfat. Vid blandning med mikronäringsämnen fordras god omrörning.

I vete och råg skall Forbel 750 ej blandas med ammoniumhaltiga N-medel eller urea. I korn kan Forbel 750 blandas med ammoniumhaltiga N-medel eller urea upp till 15 kg N/ha. Spruta ej vid varmt och soligt väder.

Tillredning

Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Forbel 750 tillsättes under omrörning och resterande vattenmängd fylls på. Blandning med ammoniumhaltiga N-medel eller urea skall utsprutas omedelbart.

Resistens

Forbel 750 tillhör den kemiska gruppen aminer och den kemiska undergruppen morfoliner. FRAC koden är 5 eller G2 och betraktas av FRAC (Fungicide Resistance Committee) att ha låg till medium risk för att utveckla resistens. Använd inte upprepad behandling med enbart Forbel 750 mot mjöldagg och sköldfläcksjuka vid högt sjukdomstryck. Vid mer än en behandling med Forbel 750 rekommenderas att blanda med Flexity(annat verknings sätt).

Avfallshandtering

Förpackningen får inte återanvändas. Preparatresten och ej rengjord förpackning lämnas på insamlingsställe för farligt avfall. BASF är anslutna till SvepReturs insamlings- och återvinningsystem för plastförpackningar (tel 0370 17385, www.svepretur.se).

Tomförpackningar: Sköljs omsorgsfull, minst 3 ggr, med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningarna rinna av upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar, med avtagen skruvkork, lämnas för energitvinnning vid av SvepRetur anvisad insamlingsplats. Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballage och spruta.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningsplats eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen.

Lagring

Ha god ventilation av lager och utrymmen där produkten hanteras. Lagra i ett låst, torrt och frostfritt utrymme, åtskilt från livsmedel och foder. Skydda från hetta och solljus. Lagringsbarhet i försluten originalförpackning 60 månader.

Ansvar

Våra preparat tillverkas under noggrann fabrikskontroll. Vi garanterar deras sammansättning. Våra bruksanvisningar och rekommendationer har föregåtts av fleråriga försök, officiella och egna, samt praktiska erfarenheter. Förändringar i förutsättningarna som nya sorter, nya eller förändrade metoder, ny teknik, resistensbildning o dyl. kan leda till försämrat eller uteblivet behandlingsresultat och i vissa fall t.o.m. till skador. Som preparatleverantör ansvarar vi icke för uppkomna skador, försämrade eller uteblivna behandlingsresultat, vilka är hänförliga till sådana förändringar i förutsättningarna, som vi inte kunnat förutse vid preparatets registrering och marknadsföring.

Forbel® 750

Bekämpningsmedel klass 2 L
Reg. nr. 3615

Endast för yrkesmässigt bruk

Verksamma beståndsdelar:

Fenpropimorf 750 g/l

Formulering: EC, emulsions koncentrat

Läs medföljande anvisningar före användning.

Varning

- H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H315 Irriterar huden.
- H332 Skadligt vid inandning.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelserna (förebyggande):

- P261 Undvik att andas sprei.
- P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.

Skyddsangivelserna (åtgärder):

- P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Skyddsangivelserna (förvaring):

- P405 Förvaras inlåst.
- P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
- SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
(Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar).

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Vid spridning ska skyddskläder användas.

Första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning: Vila , frisk luft, sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon: Skölj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, sårade ögonlock, efterkontroll hos ögonläkare

Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.

Se vidare på säkerhetsdatabladet.

Förpackningen får inte återanvändas.

Nödfallsinformation: Tel. +49 180 2273 112.

Giftinformationscentralen: Tel.010-4566700

Verkningsmekanism: FRAC code G2

Batch nr./Tilverkningsdag: Se förpackningen



5 L

Tillverkare:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

Tyskland

Ombud:

BASF A/S

Kalvebod Brygge 45, 2.

DK-1560 København V

Tel. +45 32 66 07 00

Importör:

BASF AB

Haraldsgatan 5

SE-413 14 Göteborg

Tel. 031 63 98 00

www.agro.basf.se

