

Basagran® SG

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, råg, rågvete, korn och havre med vallinsådd samt i slåtter- och frövall. Mot örtogräs i odlingar av ärter, åkerbönor och majs. Endast vårbehandling.

All annan användning är otillåten

3 kg

 **BASF**
We create chemistry



Produktbeskrivning

Basagran SG är ett kontaktverkande, låggiftigt, granulerat ogräspreparat. Den verksamma beståndsdelarna tas upp av ogräsen gröna växtdelar och påverkar fotosyntesen. För att god ogräsverkan ska uppnås, måste ogräsen täckas av tillräcklig mängd sprutvätska. *Ogräseffekten framträder relativt långsamt.* Tidig sprutning under för växtligheten gynnsamma betingelser ger säkrast resultat. Basagran SG kan endast användas på redan uppkomma ogräs. Spruta inte i samband med regn eller om ogräsen är så våta att sprutvätskan rinner av. Vid temperaturer över 20 °C: spruta inte på dagen, utan på morgon- eller kvällstid i stället. Tillsats av olja enligt nedanstående rekommendation ger säkrare effekt mot framförallt gullkrage och svinnmålla.

För skydd av grundvattnet rekommenderas inte att använda Basagran SG på jordar med låg mullhalt (<1,7%) eller på jordar med ytligt grundvattnet (<1 meter).

Bruksanvisning

Insådd av vall (med eller utan skyddssäd) med lusern, vitklöver, ren- eller blandbestånd eller alsikeklöver i renbestånd

1,15 kg/ha Basagran SG.

Tidpunkt (stråsäden utvecklingsstadiet 12-25, slåtter och frövall stadiet 25).

- med skyddssäd: klöver/lusernplantorna minst spadbladsstadiet

Tillsats av olja ger säkrare ogräseffekt mot framförallt svinnmålla.

Mot gullkrage – i stråsäd med insådd, även rödklöver

1,15 kg/ha Basagran SG + olja, från det att klöverplantorna har minst spadblad och t o m 2 trevåningar (stråsäden stadium 12-25).

Frövallar

Vårbehandlingen ska ske tidigt, så snart ogräset börjat växa. Temperaturen får då inte vara för låg, men viktigare än en viss dagstemperatur är en någorlunda jämn dygnstemperatur och solsken vid behandlingstillfället.

Frövallar av rödklöver, vitklöver och alsikeklöver

Vårbehandling. 1,15 kg/ha Basagran SG när ogräset börjar växa. (stadium 25)

Gräsfrövall

Vårbehandling. 1,15 kg/ha Basagran SG + 100 g/ha Matrigon 72 SG så snart gräset börjar växa på våren. (stadium 25)

Kokärter och foderärter i renbestånd

0,6 kg/ha Basagran SG + 0.75 l/ha Fenix då ärterna är 3 – 8 cm höga (stadium 11-18).

Konservärter

0,6 kg Basagran SG i sprutprogram med andra produkter. (stadium 11-18)

Åkerböror

0,6 kg/ha Basagran SG då börona är 3 – 8 cm höga (stadium 11-18). Vid riklig förekomst av svinnmålla m.fl. storvuxna ogräs, tillsätt olja. Vid varmt väder kan en övergående brännskada uppkomma. Blanda inte Basagran SG med insektsmedel.

Majs

1,15 kg/ha Basagran SG + olja då ogräsen har max 4 örtblad, oberoende av majsens utvecklingsstadium (stadium 12-14).

Ytterligare villkor

Vid påfyllning av spridningsutrustningen ska preparatpåfyllare användas. villkoret är till för att skydda ögonen. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vattenmängd

Vattenmängden anpassas till sprututrustning och sprutbetingelser.

Riktvärde: 300 – 400 l/ha.

Blandbarhet

Blandbart med de vanligaste ogräsmedlen, insekticider i stråsäd med eller utan insädd, med fungicider och Cycocel® Plus. Vid mikronäringsämnen, t ex Mantrac® Optiflow, fordras god omrörning. Vid sprutning med Basagran SG + olja får endast mangankelat eller Mantrac inblandas. Blandning med övriga preparat avråds.

Att iakttaga

Basagran SG är säkrare än fenoxisyror att använda i närheten av andra grödor (t ex raps, kål, grönsaker), trädgårdar, växthus etc, men man bör trots detta se upp med vindavdrift. Basagran SG har inget biologiskt verksamt ångtryck, vilket betyder att ej uppkomna grödor inte kan skadas.

Tillredning

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.

Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Basagran SG tillsätts under omrörning och resterande vattenmängd fylls på.

Avfallshantering

Förpackningen får inte återanvändas för något ändamål. Preparatresten och ej rengjord förpackning lämnas på samlingsställe för farligt avfall. BASF är anslutna till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (tel 0370 17385, www.svepretur.se).

Tomförpackningar: Sköljs omsorgsfull, minst 3 ggr, med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningarna rinna av upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar, med avtagen skruvkork, lämnas för energiutvinning vid av SvegRetur anvisad samlingsplats. Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballage och spruta.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvegReturs återvinningsplats eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen.

Observera

Våra preparat tillverkas under noggrann fabrikskontroll. Vi garanterar deras sammansättning. Våra bruksanvisningar och rekommendationer har föregåtts av fleråriga försök, officiella och egna, samt praktiska erfarenheter. Förändringar i förutsättningarna som nya sorter, nya eller förändrade metoder, ny teknik, resistensbildning o dyl kan leda till försämrat eller uteblivet behandlingsresultat och i vissa fall t o m till skador.

Som preparatleverantör ansvarar vi icke för uppkomna skador, försämrade eller uteblivna behandlingsresultat, vilka är hänförliga till sådana förändringar i förutsättningarna, vom vi inte kunnat förutse vid preparatets registrering och marknadsföring.

Utvidgat användningsområde (off-label, UPMA)

Utvidgat användningsområde för Basagran SG gäller enligt nedanstående tabell. Informationen är hämtad från KEMI:s hemsida i juni 2015. Den som använder växtskyddsmedel enligt godkännande för mindre användningsområde (off-label, UPMA) ansvarar själv för eventuella skador på grödan eller bristande effektivitet.

Utvidgat godkännande för mindre användningsområden bygger på få försöksresultat och observationer. Alla situationer där produkten får användas är inte utprovade. Produktens effekt kan ibland vara känd utifrån effekter i andra grödor. Övriga krav och bestämmelser på etiketten ska följas även vid användning enligt utvidgat produktgodkännande.

Gröda	Skadegörare	Dosering, kg/ha	Övriga villkor
Bruna bönor	Mot ogräs	Max. 0,6 kg/ha	
Konservärt	Mot ogräs	2 * 0,6 kg/ha	Högst 2 behandling/år. Om två behandlingar ska utföras ska båda dessa ske mellan 1 maj och 15 juli. Samma fält får inte behandlas oftare än vart tredje år.

Basagran® SG

Bekämpningsmedel klass 2 L
Reg. nr. 4115

Endast för yrkesmässig bruk

Ogräsmedel

Verksam beståndsdel:

Bentazon 87 vikt-% (Na-salt)

Formulering; suspensions granulat (vattenlösligt granulat), SG

Fara

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H302 Skadligt vid förtäring.

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.

P261 Undvik att andas damm.

P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag kontakta

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/utvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt avfall.



Första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning: Vila , frisk luft, sök läkarhjälp. Inhalera genast kortisonpreparat i sprayform (corticosteroiddosaerosol).

Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med mycket vatten, steril skyddsförband, kontakta hudläkare.

Stänk i ögon: Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, sårade ögonlock, kontakta ögonläkare.

Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner).

Se vidare säkerhetsdatabladet

Verkningsmekanism; HRAC grupp C3

Förbud mot återanvändning av förpackning.

Läs medföljande anvisningar före användning.

Batch nr.: Se förpackningen

Tilverkningsdag: Se förpackningen

Nödfallsinformation: Tel. +49 180 2273 112. Giftinformationscentralen tel. 010-456 6700.

Tillverkare: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Tyskland

Importör: BASF AB, Haraldsgatan 5, SE-413 14 Göteborg, Tel. 031 63 98 00, www.agro.basf.se

Ombud: BASF A/S, Kællebod Brygge 45, 2., DK-1560 København V, Tel. +45 32 66 07 00

Hålles långsamt i sprutan



3 kg

® = Inregistrerat varumärke för BASF

81122421SE1117-Sweden