

Candit®

Svampmedel Användningsområde

Att användas mot svampsjukdomar i; odlingar av äpple och päron, jordgubbar, plantskoleväxter frilandsodlingar av krusbär, vinbär, blåbär, tranbär, odlingar av prydnadsväxter i växthus.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

0,5 kg


We create chemistry

Verksam beståndsdel:
Kresoxim-metyl 500 g/kg (50%)
Formulering: WG vattenlösligt granulat.
Komponenter som bestämmer faroklassen
för märkningen: KRESOXIMMETYL

Bekämpningsmedel klass 2L
Reg. Nr. 4211

Endast för yrkesmässigt bruk

Läs medföljande anvisningar före användning.

Varning

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.

P308+ P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.


P391 Samla upp spill.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

EU401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljö, följ instruktioner för användning.

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.



Första hjälpen

Avlägsna förorenade kläder.

Vid inandning: Vila, frisk luft, sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt: Tvätta noggrant med tvål och vatten.

Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen i minst 15 minuter med rinnande vatten, sårade ögonlock.

Förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt. Se vidare på säkerhetsdatabladet för produkten.

Nödfallsinformation: Tel. +49 180 2273 112.

Giftinformationscentralen +468-331231

Verkningsmekanism; QoI-fungicid, Frac kod 11 eller C3.

Förbud mot återanvändning av förpackning.

Batch nr.: Se förpackningen.

Tilverkningsdag: Se förpackningen

Tillverkare: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Tyskland
Importör: BASF AB, Haraldsgatan 5, SE-413 14 Göteborg, Tel. 031 63 98 00, www.agro.basf.se
Reg. ägare: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. DK-1560 København V.

® = Inregistrerat varumärke för BASF

81124638SE1028-Sweden



Produktbeskrivning/Verkningsätt:

Candit är ett svampmedel som tillhör gruppen av strobiluriner (Qols – quinone outside inhibitors), FRAC kod 11 eller C3. Candit verkar genom att hindra mitokondrie respirationen i svampen. Candit hindrar sporgroning och stoppar tillväxt av svampmycel samt sporulering.

Användningsvillkor och rekommenderad användning:

Använd Candit preventivt i ett sprutprogram för att uppnå bra effekt och undvika uppbyggnad av resistens. Växla mellan produkter med olika verkningsätt, olika FRAC kod, och med effekt mot aktuell sjukdom.

Gröda *	Sjukdom	Tidpunkt för beh. BBCH	Maximal dosering per behandling	Max. antal behandlingar	Behandlingsintervall (dygn)	Vattenmängd, l/ha	Karens, dagar
Äpple, päron	Skorv – <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i> , Mjöldagg – <i>Podosphaera leucotricha</i>	53 – 81	0,2 kg/ha	3	7 – 14	150 – 1000	28
Vinbär, krusbär, blåbär, tranbär, (friland)	Mjöldagg – <i>Sphaerotheca mors-uvae</i> / <i>Podosphaera mors-uvae</i> , <i>Microspora</i> spp.	51 – 85	0,2 kg/ha	2	7 – 14	150 – 1000	14
Jordgubbar *	Mjöldagg – <i>Sphaerotheca macularis</i>	11 – 89	0,2 kg/ha	2	7 – 14	150 – 1000	7
Planteskoleväxter*	Mjöldagg på roser– <i>Sphaerotheca pannosa</i> , Svartfläcksjuka på roser– <i>Diplocarpon rosae</i>	11 – 89	0,06 – 0,2 kg/ha eller 20 mg/m ²	3	7 – 14	1000	Får inte användas på växter som ska ätas.
Prydnasväxter i växthus	Vit rost på krysanterium – <i>Puccinia horiana</i>	11 – 89	0,06 – 0,2 kg/ha eller 20 mg/m ²	3	7 – 14	1000	Får inte användas på växter som ska ätas.

* När det inte är specificerat att användning gäller för friland eller växthus får produkten användas både på friland och i växthus. Tunnelodling betraktas som odling på friland.

Äpple och päron

Behandla mot skorv och/eller mjöldagg från knoppsprickning (BBCH 53) till begynnande mognad, frukten börjar få sortspezifisk färg (BBCH 81). Maximal dosering per behandling är 0,2 kg/ha. Maximalt antal behandlingar per säsong och gröda är 3. Minsta intervallet mellan behandlingarna är 7 dagar. Vid högt sjukdomstryck bör inte behandlingsintervallet överskrida 7 – 14 dagar. Karens är minst 28 dagar.

Maximalt 2 efterföljande behandlingar med produkter som innehåller Qol-svampmedel (strobiluriner) är att föredra. Om resistens finns tillför endast produkter som innehåller Qol-svampmedel i blandning med produkter med annat verkningsätt och effekt mot skorv. Växla mellan produkter med olika verkningsätt, olika FRAC kod.

Vinbär, krusbär, blåbär, tranbär på friland

Behandla mot mjöldagg från början av knoppsvällning, (BBCH 51) till strax före full mognad (BBCH 85). Maximal dos per behandling är 0,2 kg/ha. Maximalt antal behandlingar per gröda och säsong är 2. Minsta intervallet mellan behandlingarna är 7 ww– 14 dagar. Karens är 14 dagar.

Jordgubbar

Behandla mot mjöldagg från det att första bladet utvecklas (BBCH 11), tills det är tid för den andra skörden (BBCH 89). Maximal dos per behandling är 0,2 kg/ha. Maximalt antal behandlingar per gröda och säsong är 2. Minsta intervallet mellan behandlingar är 7 – 14 dagar. Karens är minst 7 dagar. Candit kan användas på jordgubbar odlade både på friland och i växthus. Tunnelodling betraktas som odling på friland.

Planteskoleväxter (rosor), prydnadsväxter i växthus (krysantemum)

Behandla från det att första bladet utvecklas (BBCH 11) tills frukterna är fullt utvecklade (BBCH 89) (före det att bladen börjar missfärgas på grund av naturlig ålderdom). Rekommenderad dosering är 0,06 – 0,2 kg/ha. Maximalt antal behandlingar per gröda och säsong är 3. Minsta intervallet mellan behandlingarna är 7 – 14 dagar. Karens är inte relevant. Candit kan användas mot mjöldagg ogc7 eller svartfläcksjuka på rosor odlade både på friland, tunnel eller i växthus. Candit kan användas mot vitrost på krysantemum som odlas i växthus. Växter som ska ätas får inte behandlas med Candit.

Inga negativa effekter kan förväntas på rov kvalster (Acari: Phytoseiidae) på grund av användning av Candit.

Ytterligare villkor

Åtgärder för skydd av miljö vid användning av **bomspruta**. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av „Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom“. Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.

Åtgärder för skydd av miljö vid användning av **fläktspruta**.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av „Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling“. Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.

Åtgärder för skydd av **grundvatten**.

Endast för användning i äpple- och päronodlingar där marken mellan trädraderna är bevuxen.

Personlig **skyddsutrustning**

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

Utformning av **växthus**

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.

Vid **återinträde** i behandlade **växthus**

Återinträde i växthus där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddskläder och skyddshandskar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Utvidgat godkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Utvidgat användningsområde för Candit regnr 4211 gäller enligt nedanstående tabell. Informationen är hämtad från KEMI:s hemsida i juni 2016. Den som använder växtskyddsmedel enligt godkännande för mindre användningsområde ansvarar själv för eventuella skador på grödan eller bristande effektivitet. Utvidgat godkännande för mindre användningsområden bygger på få försöksresultat och observationer. Alla situationer där produkten får användas är inte utprovade. Produktens effekt kan ibland vara känd utifrån effekter i andra grödor. Övriga krav och bestämmelser på etiketten ska följas även vid användning enligt utvidgat produktgodkännande.

Utvidgat användningsområde (UPMA för Candit 4211)

Gröda	Skadegörare	Dosering	Övriga villkor
Purjolök	Mot svampsjukdomar	Max. 0,75 kg/ha	Endast 1 behandling per säsong. Karenstid: 14 dagar. Samma fält får inte behandlas oftare än vart femte år.
Vinodling på friland	Mot mjöldagg	0,015%-ig lösning, max 1500 l/ha.	Högst 3 behandlingar från blomning och fram till dess att druvorna har nästan full storlek men inte har börjat mogna. Behandlingsintervall: 7 – 14 dagar. Karenstid: 35 dagar.

Tankblandningar

Candit WG är enligt labb-tester fysiskt och kemiskt blandbart med; Kumulus WG (regnr 3022), Delan 700 WG (regnr 4218) och Scala 400 SC(4265).

Vid blandning av två eller fler komponenter starta alltid med de fasta formuleringarna, i följande ordning, WG, WP, SG, SP. Tillsätt därefter eventuella flytande formuleringar, först vattenbaserade, i ordningen, SC, CS, SL. Därefter formuleringar baserade på lösningsmedel, i ordningen, SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME.

Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst innan nästa produkt tillsätts.

Sprutteknik:

Candit ska tillföras med en fält/fläkt spruta som är kalibrerad och kontrollerad enligt gällande lagstiftning. Starta alltid sprutjobbet med en väl rengjord spruta.

Fyll sprutan till $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ med vatten. Tillsätt produkten/produkterna. Tillsätt resterande mängd vatten.

Under hela tiden blandning och sprutning pågår ska omrörningen vara på. Använd alltid sprutblandningen omedelbart efter blandning.

Sprutvätskan ska spridas jämnt på hela grödan. Ju större bladmassa, till exempel stora träd, desto större vattenmängd krävs.

Rengör sprutan efter användning.

Regnfasthet

Candit förväntas vara regnfast en timme efter sprutning.

Resistens

Candit tillhör QoI-gruppen av svampmedel (FRAC kod 11 eller C3) och betraktas av FRAC(Fungicide Resistance Committee) att ha en hög risk för att utveckla resistens. I äpple har resistens skorv hittats.

Upprepad användning av produkter med samma verkningsätt ökar risken för att utveckla resistens. För att minska risken för resistens uppbyggnad rekommenderas att blanda eller växla mellan produkter med effekt på aktuell sjukdom, men med olika verkningsätt. Det vill säga produkterna bör ha olika FRAC-kod och därmed olika verkningsätt. Risken för resistens kan minskas genom tidiga behandlingar vid lågt infektionstryck.

För ytterligare information kring resistenshantering, se www.frac.info

Avfallshantering

Förpackningen får inte återanvändas för något ändamål, förutom återvinning. Preparatresten och ej rengjord förpackning lämnas på samlingsställe för farligt avfall. BASF är anslutna till SvepReturs samlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (tel 0370 17385, www.svepretur.se).

Tomförpackningar: Sköljs omsorgsfull, minst 3 ggr, med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningarna rinna av upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar, med avtagen skruvkork, lämnas för energiutvinning vid av SvepRetur anvisad samlingsplats. Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballage och spruta.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningsplats eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen.

Lagring

Ha god ventilation av lager och utrymmen där produkten hanteras. Lagra i ett låst, torrt och frostfritt utrymme, åtskilt från livsmedel och foder. Skydda från hetta och solljus. Utsätt inte produkten för temperaturer över 40 °C. Lagringsbarhet i försluten originalförpackning 60 månader.

Ansvar

Våra preparat tillverkas under noggrann fabrikskontroll. Vi garanterar deras sammansättning. Våra bruksanvisningar och rekommendationer har föregåtts av fleråriga försök, officiella och egna, samt praktiska erfarenheter. Förändringar i förutsättningarna som nya sorter, nya eller förändrade metoder, ny teknik, resistensbildning o dyl. kan leda till försämrat eller uteblivet behandlingsresultat och i vissa fall t.o.m. till skador.

Som preparatleverantör ansvarar vi icke för uppkomna skador, försämrade eller uteblivna behandlingsresultat, vilka är hänförliga till sådana förändringar i förutsättningarna, som vi inte kunnat förutse vid preparatets registrering och marknadsföring.

Candit®

Svampmedel Användningsområde

Att användas mot svampsjukdomar i; odlingar av äpple och päron, jordgubbar, plantskoleväxter frilandsodlingar av krusbär, vinbär, blåbär, tranbär, odlingar av prydnadsväxter i växthus.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

0,5 kg


We create chemistry


Verksam beståndsdel:
Kresoxim-metyl 500 g/kg (50%)
Formulering: WG vattenlösligt granulat.
Komponenter som bestämmer faroklassen
för märkningen: KRESOXIMMETYL

Bekämpningsmedel klass 2L
Reg. Nr. 4211

Endast för yrkesmässigt bruk

Läs medföljande anvisningar före användning.

Varning
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.
P308+ P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)
EU401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljö, följ instruktioner för användning.
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.



Första hjälpen

Avlägsna förorenade kläder.

Vid inandning: Vila, frisk luft, sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt: Tvätta noggrant med tvål och vatten.

Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen i minst 15 minuter med rinnande vatten, sårade ögonlock.

Förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

Se vidare på säkerhetsdatabladet för produkten.

Nödfallsinformation: Tel. +49 180 2273 112.

Giftinformationscentralen +468-331231

Verkningsmekanism; QoI-fungicid, Frac kod 11 eller C3.

Förbud mot återanvändning av förpackning.

Batch nr.: Se förpackningen.

Tilverkningsdag: Se förpackningen

Tillverkare: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Tyskland
Importör: BASF AB, Haraldsgatan 5, SE-413 14 Göteborg, Tel. 031 63 98 00, www.agro.basf.se
Reg. ägare: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. DK-1560 København V.



4 0 4 1 8 8 5 0 5 5 7 3 6 1

@ = Inregistrerat varumärke för BASF

81124638SE1028-Sweden