

# Pictor® Active

PENGAR  
VÄXER  
INTE PÅ  
TRÄD

**...men väl i din raps!**

Försök i raps med Pictor® Active, gav den mest effektiva svampbekämpningen inkl. ljusbladfläcksjuka. Pictor® Active har i försöken gett högst merskörd. Det gör Pictor® Active till Sveriges starkaste och bredaste svampmedel i raps. Pictor® Active gav högre skörd och täckningsbidrag än övriga svampmedel i raps.

**27 svenska officiella försök  
visar att, Pictor Active gav:  
+ 1400 kr/ha brutto mer än obehandlat**

**Utdrag av 27 försök - 2017-2020: L9-8450  
Svampbekämpning i höstrapsens blomning  
Rapspris 4,06 kr/kg**



[agro.basf.se/pictor-active](https://agro.basf.se/pictor-active)

**BASF**  
We create chemistry

# Pictor® Active

**Pictor Active** innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. Formuleringen av **Pictor Active** är utvecklad speciellt för användning i raps, och säkrar maximal fördelning och upptag. **Pictor Active** är ett säkert skydd mot bomullsmögel (*Sclerotinia*) och svartfläcksjuka (*Alternaria*) i oljeväxter. Dessutom ger AgCelence jämnare mognad och bättre stresstolerans. Små mängder av aktiv substans tas upp via bladen och förflyttas en kortare sträcka i plantan. Huvuddelen av aktiv substans fastnar utanpå plantan, för att på bästa sätt skydda mot sporinfektioner under lång tid. **Pictor Active** är utvecklat för att ge lång verkningstid och har en flexibel behandlingstidpunkt.

## Boscalid

Boscalid tillhör gruppen SDHI och är ett systemiskt och translaminärt svampmedel, för användning mot svampsjukdomar i raps och rybs. I plantan påverkas svampen strax efter infektion har skett, sporspridning och vidare tillväxt av svampen förhindras. Därmed förhindras även utveckling av mycel och sporer av de svampsjukdomar som den är verksam mot. De delar av bladet som inte träffas kommer att skyddas genom systemisk och tranlaminär effekt efter behandling.

Boscalid och pyraklostrobin ökar produktionen av antioxidanter och därmed stresstoleransen mot t.ex. torka och ozon samt stärker växtens naturliga försvarsmekanismer (immunförsvar).

## Pyraklostrobin

Pyraklostrobin tillhör gruppen strobiluriner. Pyraklostrobin är inte systemiskt, men fördelas ändå effektivt i växtvävnaden utan att behöva absorberas i växtens saftström. Förutom att ha en bra effekt mot ett brett antal svampsjukdomar har pyraklostrobin och boscalid också ett antal väl dokumenterade fysiologiska effekter, vilket i vissa fall har en positiv effekt på skörd / kvalitet - även utan angrepp av svampsjukdomar.

## Rekommendation / Raps och rybs

Mot bomullsmögel (*Sclerotinia sclerotiorum*), svartfläcksjuka (*Alternaria* spp.).

- Flexibel användning (BBCH 60 - 69)
- Enkelbehandling 0,7 - 1,0 l/ha (BBCH 63 - 69)
- Delad behandling 0,7 och 0,3 l/ha (intervall minst 7 dagar)
- Delad behandling 0,5 och 0,5 l/ha (intervall minst 7 dagar)

Optimal behandlingstidpunkt är i BBCH 65. Vid högt smittotryck eller hög risk för angrepp av bomullsmögel upprepa behandlingen efter 10 - 12 dagar. Den totala mängden som används i grödan får inte överstiga 1 l/ha. Sprutintervallet mellan behandlingarna, minst 7 dagar.

## Användning

### Tillredning

Fyll spruttanken till 1/2 - 3/4 delar med rent vatten och starta omrörningen. Tillsätt produkten / produkterna. Tillsätt resterande mängd vatten. Under hela tiden beredning och sprutning pågår ska omrörningen vara igång.

### Vattenmängd

Använd mängd vatten bör vara 200 - 400 l/ha, det är klart rekommendabelt att använda minst 200 l/ha för jämn täckning och tillräcklig nedträngning i beståndet.

## Blandbarhet

**Pictor Active** är blandbart med de flesta ogräs-, insekts- och svampmedel som finns på svensk marknad. Läs alltid etiketterna före blandning.

**Pictor Active** kan blandas med formulerade bor, magnesium och manganprodukter.

## Regnfast

**Pictor Active** är regnfast 3 timmar efter behandling.

## Förvaring

**Pictor Active** skall lagras i frostfritt utrymme i obruten och oskadad förpackning.

