

Tanaris®

Ogräsmedel

Mot örtogräs i odlingar av vårraps och mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Läs medföljande anvisningar före användning.

Formulering: Suspensionsemulsion, SE

Verkningsmekanismer enligt HRAC:

GRUPP	4 (O)	15 (K3)	OGRÄSMEDEL
-------	-------	---------	------------

Förbud mot återanvändning av förpackning.

Batch nr./Tillverkningsdag: Se förpackningen



81190971 SE 2066 CLP



**EASY
CONNECT**
www.easyconnect.tech

5 L

® = Inregistrerat varumärke för BASF



Tanaris®

Behörighetsklass 2 L
Endast för yrkesmässigt bruk.
Reg. nr. 5411

UFI: KYS3-M04J-8005-QW1M

Verksamma ämnen:

Dimetenamid-P 333 g/l

Kinmerak 167 g/l

Övrigt ämne: 2-Metyl-4-isotiazolin-3-on

Registreringsinnehavare: BASF AB, Sven

Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg, Tel. 031 63 98

00, www.agro.basf.se

VARNING



81190970 SE 2066 CLP



5 L

® = Inregistrerat varumärke för BASF



VARNING

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P261 Undvik att inandas sprj.

P280 Använd skyddshandskar och ögon/ansiktsskydd.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P391 Samla upp spill.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Spe1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande kinmerak under de efterföljande två åren på samma fält när produkten har använts i odlingar av vårraps.

Spe1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande kinmerak eller dimetenamid-P under det efterföljande året på samma fält när produkten har använts i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning: Vila, frisk luft. Sök läkarhjälp

Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon: Skölj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, sårade ögonlock, efterkontroll hos ögonläkare.

Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.

Symptom: De viktigaste kända symptom och effekter anges i märkning och på säkerhetsdatabladet (se avsnitt 2 eller 11). Ytterligare viktiga symptom och effekter är hittills inte känt.

Behandling: Behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt. Se vidare på säkerhetsdatabladet för produkten.

Nödfallsinformation: Tel. +49 180 2273 112,

Giftinformationscentralen: 010-456 6700, Akut förgiftning: 112

Produktbeskrivning

Dimetenamid-p tillhör gruppen kloracetamid herbicider. Verkningsmekanismen tros fungera genom hämning av syntesen av mycket långa fettsyror i lipidbiosyntesvägen. Detta ger upphov till hämmad tillväxt, deformation och att groende ogräs dör. Verkningsmekanismen hos kinmerak är liknande den hos syntetiska auxiner (växthormon).

Dimetenamid-p tas upp av växten via rötterna och genom de groende skotten (hypokotyl / epikotyl). Därför är herbicidaktivitet av dimetenamid-p begränsad till groning och tidiga tillväxtfaser hos ogräset. Dimetenamid-p har liten eller ingen bladverkan och minimal rörlighet / translokation i ogräset. Kinmerak tas upp av blad och rötter och transporteras både från rötter till blad och från blad till rötter. Dessa kombinerade egenskaper innebär att den optimala tidpunkten för Tanaris är mycket tidigt efter ogräsens uppkomst.

Effekt

Effekt av behandling efter uppkomst med sammanlagt 1,5 l/ha Tanaris i respektive vårraps och sockerbetor/foderbetor ses i tabellerna nedan.

Tabell. Effekt på ogräs i vårraps vid behandling efter uppkomst och dosering 1.5 l/ha Tanaris.

Mycket bra effekt (85-94.9% kontroll)	Bra effekt (70-84.9% kontroll)	Moderat effekt (40-69.9% kontroll)
Snärjmåra (<i>Galium aparine</i>)	Baldersbrå (<i>Tripleurospermum perforatum</i>)	Lomme (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)
	Rödplister (<i>Lamium purpureum</i>)	
	Blåklint (<i>Centaruea cyanus</i>)	

Tabell. Effekt på ogräs i sockerbetor och foderbetor vid behandling efter uppkomst med doseringen 0.3 + 0.6 + 0.6 l/ha Tanaris.

Utmärkt effekt (95-100% kontroll)	Mycket bra effekt (85-94.9% kontroll)	Bra effekt (70-84.9% kontroll)	Moderat effekt (50-69.9% kontroll)
Rödplister (<i>Lamium purpureum</i>)	Våtarv (<i>Stellaria media</i>)	Hönshirs (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	Vildpersilja (<i>Aethusa cynapium</i>)
		Snärjmåra (<i>Galium aparine</i>)	Jordrök (<i>Fumaria officinalis</i>)
		Trädgårdsveronika (<i>Veronica persica</i>)	Kamomil/ (<i>Matricaria chamomilla</i>)
			Baldersbrå (<i>Tripleurospermum inodorum</i>)
			Vitgröe (<i>Poa annua</i>)
			Nattskatta (<i>Solanum nigrum</i>)

Villkor för godkänd användning

Villkor för godkänd användning är lagkrav och måste följas av den som använder produkten. Godkänd användning ges av tabellen nedan samt text med ytterligare villkor.

Tabell. Villkor för godkänd användning.

Gröda	Syfte	Tidpunkt, utvecklingsstadium, (BBCH)	Max dosering per behandling	Max antal behandlingar	Övriga villkor och förtydliganden
Sockerbetor, foderbetor	Mot ogräs	Utvecklingsstadium 10-16 (hjärtblad-6 örtblad)	Max 0,6 l/ha	3 per år	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,5 L produkt per hektar och år. Minst 5 dagar mellan varje behandling. Behandlingsutrustning: Bomspruta
Vårrops	Mot örtogräs	Utvecklingsstadium 10-18 (hjärtblad-8 örtblad)	Max. 1.5 l/ha	1 per år	Behandlingsutrustning: Bomspruta

Ytterligare villkor

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av „Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom“.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid hantering av produkten.

Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Rekommenderad användning

Tanaris får användas enligt tabell ovan för godkänd användning. Tanaris ska användas på våren efter uppkomst i vårraps, sockerbetor och foderbetor. Det är mycket viktigt att använda tidigt på små ogräs för att få optimal effekt. Tanaris bör i sockerbetor och foderbetor användas i ett behandlingsprogram tillsammans med andra ogräsprodukter.

För att få optimal effekt kräver båda aktiva substanserna tillräcklig markfukt. Detta för att kunna lösas upp och fördelas i jorden och därmed kunna tas upp av groende rötter och skott. Under torra förhållanden kan effekten av Tanaris fördröjas tills regn inträffar. När fuktnivåerna i jorden är tillräckliga för att utlösa groning är de också tillräckliga för att aktivera Tanaris och ge effekt på ogräsen. Därför är optimala groningsförhållanden i form av fuktighet och fin såbädd positivt för upptag och effekt av Tanaris.

Använd inte Tanaris på sandjordar eller mycket lätta jordar med lågt organiskt innehåll. Tanaris kan ge en viss negativ påverkan på grödans vigör. På jordar med högt organiskt innehåll bör behandlingen göras tidigt efter uppkomst för bästa effekt. På jordar med mer än 6-10% organiskt innehåll avråds från att använda Tanaris på grund av risk för otillräcklig effekt.

Vid kraftig markfukt och låg temperatur kan en övergående tillväxthämning uppstå. Behandla inte när kraftiga regn väntas. En påverkan på beståndet kan uppstå om det är mycket vått väder efter behandlingen. Detta rättar normalt till sig efter några veckor och påverkar inte skörden. Behandla inte i samband med frost. Grödan kan tillfälligt bli påverkad.

Undvik dubbelsprutningar.

Behandla inte Tanaris på grödor som lider av stress, t.ex. från angrepp av skadedjur, sjukdomar, syrebrist, dålig etablering eller tidigare kemisk behandling.

Efterföljande grödor vid normalt skördad gröda

Efter en normalt skördad gröda som behandlats med Tanaris kan valfri gröda sås utan krav på någon speciell jordbearbetning. Undantag gäller för bladgrönsaker som inte bör sås på hösten efter att Tanaris använts på våren samma år.

Efterföljande grödor vid behov av omsådd

Vid behov av omsådd kan följande grödor sås utan krav på specifik jordbearbetning vårraps, sockerbetor, foderbetor, kål, lök, majs, ärtor och åkerbönor. Vårstråsåd kan också sås men då krävs jordbearbetning till minst 10 cm djup före sådd och en tidsperiod på minst 15 dagar mellan behandling och omsådd. Rajgräs kan sås efter jordbearbetning till 10 cm och en tidsperiod på minst fyra månader mellan behandling och omsådd.

Angränsande grödor

Försiktighet krävs för att undvika vindavdrift till angränsande grödor och växter utanför behandlad gröda. En buffertzon på minst 5 m krävs när behandling sker intill nysådd sallad, morötter eller vall/bete.

Tankblandningar

Produkten kan blandas med andra produkter. Sök råd för aktuell blandningspartner.

Sprutteknik

Produkten ska tillföras med en växtskyddsspruta som är kalibrerad och kontrollerad enligt gällande lagstiftning. Starta alltid arbetet med en väl rengjord spruta. Skaka dunken väl före blandning.

Fyll sprutan till $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ med vatten. Tillsätt produkten/produkterna. Tillsätt resterande mängd vatten. Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst innan nästa produkt tillsätts. Under hela tiden blandning och sprutning pågår ska omrörningen vara på. Använd alltid sprutblandningen omedelbart efter tillredning. Undvik överlapp i fältet och avdrift från fältet. Vindhastigheten bör vara låg vid sprututfallet (under 4 m/s). Val av munstycke bör anpassas till gällande fält- och väderförhållanden. God täckning är viktigt för bra effekt.

Vattenvolym 100-400 l/ha

Rengöring

Rengör alltid sprutan med rent vatten och rengöringsmedel avsett för växtskyddssprutor efter avslutad användning för dagen eller vid byte av produkt.

1. Skölj invändigt med 1/3 av sköljvattentankens volym. Cirkulera vattnet i systemet. Spruta ut i fält. Upprepa 3 gånger. Sprutan töms sedan helt på biobädd, påfyllningsplatta eller biologiskt aktiv mark.
2. Rengör traktor och spruta utvändigt, gärna i fält.
3. Följ instruktioner för rengöringsmedel avsett för växtskyddssprutor. Vatten och rengöringsmedel ska sköljas genom alla delar av sprututrustningen.
4. Munstycken och filter tas ut och rengörs separat med rengöringsmedel för växtskyddssprutor.

Följ gällande regler och rekommendationer.

Resistens

Dimetenamid-p tillhör den kemiska gruppen kloracetamider (HRAC grupp 15 / K3). Kinmerak tillhör den kemiska grupp som kallas kinolinkarboxylsyra syror (HRAC grupp 4 / O). Trots användning i mer än 20 år har ingen resistens upptäckts mot dimetenamid-p eller kinmerak i Europa.

Avfallshantering

Förpackningen får inte återanvändas. Preparatresten och ej rengjord förpackning lämnas på insamlingsställe för farligt avfall. BASF är anslutna till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (tel 0370 17385, www.svepretur.se).

Tomförpackningar: Sköljs omsorgsfullt, minst 3 ggr, med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningarna rinna av upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar, med avtagen skruvkork, lämnas för energiutvinning vid av SvegRetur anvisad insamlingsplats. Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballager och spruta.

Transportförpackningar: som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvegReturs återvinningsplats eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen.

Lagring

Sörj för god ventilation av lager och utrymmen där produkten hanteras. Lagra i ett låst, torrt och frostfritt utrymme, åtskilt från livsmedel och foder. Skydda från hög temperatur och solljus. Lagringsbarhet i försluten originalförpackning 24 månader.

Rättsligt ansvar

Vi garanterar produkternas sammansättning och kvalitet. Tillverkaren är inte ansvarig för bristande effekt eller skador, inklusive följdskador, som uppkommit på grund av att rekommendationer för lagring och användning inte följts.

EASY CONNECT



Easyconnect-systemet är avsett att användas med en koppling.

Steg-för-steg instruktioner för användning med koppling:

- Skruva INTE av easyconnect-locket
- Ta bort skyddet mot damm.
- **Tryck INTE in pluggen manuellt i behållaren!**
- Vänd behållaren upp och ner för att ansluta easyconnect-locket till kopplingen, följ sedan instruktionerna från din kopplingsleverantör.
- Efter fullständig tömning och sköljning, tryck in pluggen i behållaren med hjälp av en pigg på kopplingen, vilket gör att eventuellt återstående sköljvatten kan rinna av.
- Easyconnect-locket kan återvinnas tillsammans med behållaren enligt aktuella föreskrifter. Överför inte locket till andra behållare.
- **Obs:** Vid användning av easyconnect-systemet, fortsätt att bära skyddskläder enligt instruktionerna på produktetiketten.



För mer information, besök www.easyconnect.tech

Om du ännu inte har en koppling, skruva bara av locket för konventionell fyllning.

Steg-för-steg instruktioner för konventionell användning:

- Ta INTE bort skyddet mot damm!
- **Tryck ALDRIG in pluggen manuellt i behållaren!**
- Om du inte har en koppling kan easyconnect-lock användas på samma sätt som traditionella lock.
- Skruva av easyconnect-locket och håll vätskan i preparatpåfyllaren.
- **Obs:** Vid konventionell fyllning drar du inte nytta av fördelarna med easyconnect-systemet.
- Efter konventionell användning måste easyconnect-locket återvinnas enligt aktuella föreskrifter.

Tanaris®

Behörighetsklass 2 L
Endast för yrkesmässigt bruk.
Reg. nr. 5411

UFI: KYS3-M04J-8005-QW1M

Verksamma ämnen:

Dimetenamid-P 333 g/l

Kinmerak 167 g/l

Övrigt ämne: 2-Metyl-4-isotiazolin-3-on

Registreringsinnehavare: BASF AB, Sven

Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg, Tel. 031 63 98

00, www.agro.basf.se

VARNING



81190970 SE 2066 CLP

5 L

® = Inregistrerat varumärke för BASF



Tanaris®

UFI: KYS3-M04J-8005-QW1M

Verksamma ämnen:

Dimetenamid-P 333 g/l

Kinmerak 167 g/l

Övrigt ämne: 2-Metyl-4-isotiazolin-3-on

VARNING

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P261 Undvik att inandas spray.

P280 Använd skyddshandskar och ögon/ansiktsskydd.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P391 Samla upp spill.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Spe1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande kinmerak under de efterföljande två åren på samma fält när produkten har använts i odlingar av vårraps.

Spe1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande kinmerak eller dimetenamid-P under det efterföljande året på samma fält när produkten har använts i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Registreringsinnehavare: BASF AB, Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg, Tel. 031 63 98 00,
www.agro.basf.se

VARNING



81190973 SE 2066 CLP



Tanaris®

Ogräsmedel

Mot örtogräs i odlingar av våraps och mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Läs medföljande anvisningar före användning.

Behörighetsklass 2 L
Endast för yrkesmässigt bruk.
Reg. nr. 5411

Formulering: Suspensionsemulsion, SE

Verkningsmekanismer enligt HRAC:

GRUPP	4 (O)	15 (K3)	OGRÄSMEDEL
-------	-------	---------	------------

Förbud mot återanvändning av förpackning.

Batch nr./Tillverkningsdag: Se förpackningen

Första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning: Vila, frisk luft. Sök läkarhjälp

Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon: Skölj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, sårade ögonlock, efterkontroll hos ögonläkare.

Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.

Symptom: De viktigaste kända symptom och effekter anges i märkning och på säkerhetsdatabladet (se avsnitt 2 eller 11). Ytterligare viktiga symptom och effekter är hittills inte känt.

Behandling: Behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt. Se vidare på säkerhetsdatabladet för produkten.

Nödfallsinformation: Tel. +49 180 2273 112,
Giftinformationscentralen: 010-456 6700, Akut förgiftning: 112

4x5 L



(01)04041885051998

**EASY
CONNECT**
www.easyconnect.tech



® = Inregistrerat varumärke för BASF



81190972 SE 2066 CLP

